GEBRUIKERSINFORMATIE



IMMEDIAAT GEBIT

HIERBIJ UW NIEUWE AVADENT GEBIT, ZEKER GEEN GEWOON GEBIT.

Deze handleiding biedt u belangrijke informatie voor het optimaal gebruik en onderhoud van uw gebit. Lees de instructies zorgvuldig door en volg altijd de adviezen van uw behandelaar. Bewaar de volledige inhoud van de doos, inclusief uw AvaDent I.D., goed.



UW AVADENT I.D.

Met uw AvaDent I.D. zijn uw gebitsgegevens veilig opgeslagen in onze digitale database, wat vele voordelen oplevert:

- **Snelle vervanging van uw kunstgebit:** Bij verlies of schade ontvangt u binnen 4 werkdagen een nieuw gebit via uw behandelaar, vaak zonder dat u opnieuw een afspraak hoeft te maken.
- **Preventieve reserve:** U kunt een exacte kopie van uw gebit aanvragen als reserve.
- **Behoud van uw vertrouwde uitstraling:** Indien u na dit tijdelijke kunstgebit een nieuw definitief gebit nodig heeft, kunt u indien gewenst de vorm van uw natuurlijke tanden behouden.

Met uw AvaDent I.D. kan binnen vier werkdagen een nieuwe prothese via uw behandelaar worden gemaakt. U hoeft niet opnieuw in de tandartsstoel, tenzij er aanpassingen aan uw kunstgebit zijn gedaan. Bewaar uw AvaDent I.D. dus goed!

POETSINSTRUCTIES

BOVENGEBIT



2x per dag poetsen

ONDERGEBIT





INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Belangrijk: Volg altijd de instructies van uw behandelaar op. De volgende richtlijnen zijn algemene aanbevelingen.


Mogelijke bijwerkingen bij nieuwe gebitsprothese:

- Eten/drinken kan in het begin onwennig zijn;
- Moeite met eten? Start met zacht voedsel (puree, gehakt, zacht fruit);
- Geleidelijk opbouwen naar steviger voedsel (vis, aardappelen, later vlees en brood).
- Spraak kan in het begin anders klinken; slissen mogelijk;
- Wen sneller door klanken te oefenen of hardop te lezen.

SLAPEN

In het begin moet u uw gebit 's nachts inhouden om uw kaken te laten wennen. Na 7 dagen is het beter om uw gebit 's nachts uit te doen om verminderde doorbloeding van het tandvlees en het snellere slinken van de kaak te voorkomen.





KLACHTEN

Neem bij aanhoudende klachten altijd contact op met uw behandelaar. Draag indien mogelijk uw oude prothese tot de problemen zijn opgelost. Neem altijd de volledige inhoud van de doos mee naar uw afspraak, inclusief uw AvaDent I.D., AvaDent Gebit en eventuele meegeleverde modellen.

Wij hopen dat u tevreden bent met uw nieuwe AvaDent Gebit en dat het bijdraagt aan uw comfort en welzijn.

REINIGING EN VERZORGING



Om uw gebit zo mooi mogelijk te houden en ontsteking van uw tandvlees te voorkomen, dient u het gebit minimaal twee keer per dag te reinigen (voor en na gebruik).

- **Reiniging prothese:** Gebruik een zachte tandenborstel en milde zeep (zoals groene zeep of speciale tandpasta zonder schuurmiddel, zoals Ecosym of Blue'm foam). Spoel daarna goed af.
- **Na elk gebruik:** Spoel je de prothese af met koud of lauw water (niet warmer dan 45°C).
- **Reinigen mond:** Poets en flos uw tandvlees en eventuele natuurlijke tanden. Gebruik hiervoor een zachte tandenborstel. Hierdoor verbetert de doorbloeding van uw tandvlees en houdt u uw kaken en tanden in betere conditie. Dit kunt u doen met normale tandpasta voor een fris gevoel.
- **Bewaren:** Bewaar de prothese in de nacht in een bakje en laat aan de lucht drogen.
- **Plaatsen**: Spoel de prothese af onder koud water en plaats deze vervolgens terug in uw mond.
- **Dieptereiniging:** Plaats eens per maand het kunstgebit voor 30 minuten in een bakje met een mengsel van ½ lauw water (niet warmer dan 45°C) en ½ natuurazijn. Reinig kunstgebit zoals hierboven bij "Reiniging prothese" is beschreven.
- **Transport:** Gebruik het transportdoosje zonder water, voor vervoer. Het AvaDent Gebit kan voor langere tijd droog worden bewaard.
- **Inspectie:** Controleer uw AvaDent Gebit regelmatig op schade zoals breuken of scheuren. Niet gebruiken bij schade en contact opnemen met uw behandelaar voor reparatie.

Tips om verkleuring te voorkomen:
Vermijd voedingsmiddelen met kurkuma, kerrie of curry. Vermijd direct contact met zonlicht.

PIJNSTILLING

U dient het immediaat gebit de eerste 24 uur in te houden. De verdoving is na twee tot vier uur uitgewerkt. We adviseren om na de behandeling, in overleg met uw behandelaar, pijnstilling in te nemen. Uw behandelaar kan u hierbij het type pijnstilling, de hoeveelheid en de duur van de inname adviseren. Mocht na vier dagen de pijn blijven aanhouden, neem dan contact op met uw behandelaar zodat deze de wondgenezing kan beoordelen.

NABLOEDING

Tot 12 uur na de behandeling kan er nog wat bloed uit de wond komen. Dit stopt vanzelf doordat er stolling plaatsvindt in de wond. Dit stolsel is kwetsbaar en kan wanneer u veelvuldig spoelt of vaak drinkt, losweken. Hierdoor kan er opnieuw bloeding plaatsvinden. Als u medicatie tegen stolling gebruikt en last heeft van nabloedingen, adviseren wij u dringend zo snel mogelijk contact op te nemen met uw behandelaar.

KOORTS

Het kan voorkomen dat er verhoging optreedt na de behandeling. Dit is normaal. Bij aanhoudende hoge koorts raden we u aan contact op te nemen met uw behandelaar.

ZWELLING

Het is gebruikelijk dat er zwelling optreedt die enige dagen kan aanhouden. Dit kunt u tegengaan door direct na het trekken van uw tanden en kiezen uw wangen te koelen.

ONTSTEKING

In een enkel geval kan de wond gaan ontsteken. Dit herkent u aan het langer aanhouden of het toenemen van pijn. Vaak gaat dit gepaard met koorts en een vieze smaak in de mond. In dit geval dient u contact op te nemen met uw behandelaar.

WONDGENEZING

Een wond geneest gewoonlijk na minstens twee weken. Rust is hierbij vooral de eerste dag belangrijk omdat het stolsel dan de wond moet dichten. Blijf van de hechtingen af. De eerste 24 uur wordt spoelen en sabbelen aan de wond afgeraden. Het drinken van alcohol wordt afgeraden omdat dit de kans op nabloeden vergroot. Als de verdoving is uitgewerkt kunt u weer warme dranken en voedsel nuttigen. Probeer de wond hierbij te ontzien. Voorkom roken omdat dit het genezingsproces vertraagt. Normale werkzaamheden kunt u gewoon hervatten. Voorkom de eerste week echter wel sporten, zwaar tillen en dergelijke fysieke inspanningen.

GEBIT INHOUDEN

U dient uw immediaat gebit in de eerste 7 dagen zowel overdag als 's nachts in te houden. Tenzij de behandelaar anders adviseert.

GEBIT UITNEMEN & REINIGEN EERSTE TWEE WEKEN

Het is beter om de eerste 24 uur uw mond niet te spoelen. U kunt met uw immediaat gebit in wel wat drinken. In overleg met uw behandelaar kan uw gebit na 24 uur door uw behandelaar of door uzelf worden uitgenomen. Wees zeer voorzichtig met de wonden wanneer u het zelf gaat doen. Reinig de immediaat prothese de eerste twee weken, minimaal twee keer per dag om ontstekingen te voorkomen, zoals beschreven onder het kopje 'VERZORGING' en in de 'POETSHULP'. Let hierbij op dat u uw kaken nog niet kunt poetsen als de wond nog niet volledig genezen is. Dit duurt gewoonlijk minstens twee weken. Doe na het reinigen het gebit direct weer in. In het begin zit uw immediaat gebit waarschijnlijk niet direct comfortabel. Het gebit kan klemmen, waardoor pijn ontstaat. Naarmate de wond geneest, zal dit afnemen en gaat u geleidelijk wennen aan uw gebit. Dit vergt uiteraard tijd en verschilt per patiënt. Mocht u hier moeite mee hebben, dan kunt u voor advies contact opnemen met uw behandelaar.

MONDVERZORGING

Na 24 uur kunt u uw mond spoelen met spoelmiddel. U dient hiervoor de gebruiksaanwijzing van het spoelmiddel te raadplegen. Tijdens het spoelen is het verstandig om het immediaat gebit uit te nemen.

BEOORDELING SITUATIE

Na verloop van tijd gaan uw kaken slinken, waardoor er ruimte tussen het immediaat gebit en uw kaak ontstaat. Daarom wordt na twee tot vier maanden de situatie van uw gebit beoordeeld door uw behandelaar. Er wordt dan bepaald of er aanpassingen aan het huidige gebit moeten worden gedaan (reliner of rebasing) of dat er een definitieve AvaDent gebitsprothese kan worden vervaardigd.

AVADENT® Gebit



IMMEDIAAT **GEBIT**